

# Avertissements agricoles

PUBLICATION PERIODIQUE  
ABONNEMENT ANNUEL

Régisseur de Recettes de la D.R.A.F.  
C.C.P. Montpellier 5238-12 G

Bulletin destiné aux Agriculteurs du Lauragais, Razès et de la Piège.  
(rédigé en collaboration avec la Ferme de Loudes et les G.V.A.)

N° 7 du 11 MAI 1988

\*\*\*\*\*

## BLE

\*\*\*\*\*

L'épidémie de **ROUILLE BRUNE** intéresse tous les secteurs, les variétés Primadur, et Mondur, sont les plus concernées, la maladie peut également s'observer sur Capdur, mais à des niveaux beaucoup plus faibles.

La plupart des parcelles sont à l'épiaison, il convient donc de procéder à la fois à la protection de la dernière feuille " F 1 " et de l'épi.

\* Parcelles de Primadur et de Mondur, non encore protégées en raison des intempéries.

### TRAITEZ D'URGENCE

\* Parcelles ayant déjà été traitées, dans la majorité des cas, on arrive en fin de protection, d'autant plus que les produits sont soumis à une très forte pression de Rouille Brune, RENOUVELEZ DES QUE POSSIBLE.

Les Capdurs doivent être protégés à l'épiaison complète.

Utilisez une des solutions suivantes :

- TILT C.T.....	2	L/Ha
- IMPACT T.....	2,6	"
- IMPACT T.X.....	2,5	"
- BAYFIDAN D.....	0,5 + 4	
- PUNCH.....	0,8	
- CORVET C.M.....	4 Kg	

\*\*\*\*\*

## POIS PROTEAGINEUX

Le complexe des maladies du pois est variable en fonction des situations :

Sillon, Razès, risque dominant **Anthraxoses, Botrytis** :

Utilisez : - **BRAVO plus**..... 2 L/Ha + ajoutez à la solution :

.../...

MINISTERE DE L'AGRICULTURE  
SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX  
ÉDITION DE LA STATION LANGUEDOC-ROUSSILLON  
Maison de l'Agriculture - Bâtiment 5, place Chaptal  
34076 MONTPELLIER CEDEX - Tél. 67.92.41.42



- SERK..... 1,5 L/Ha
- ou - BAYTHROID..... 0,3 L/Ha
- ou - TALSTAR..... 0,2 L/Ha (pour les pucerons et les bruches).

Dans la Piège, le **MILDIU** est dominant, sur parcelles peu attaquées, ou contamination en cours.

- Traitez avec :
- REMILTINE ou FLUVAX..... 3 Kg/Ha + ajoutez à la solution.
  - ou - SERK..... 1,5 L/Ha
  - ou - BAYTHROID..... 0,3 "
  - ou - TALSTAR..... 0,2

(pour couverture du risque pucerons et bruches).

En toutes situations, sur cultures de Pois Protéagineux Semence, si le Mildiou est présent :

- Traitez à l'aide :
- d' ACYLON SUPER Flo..... 4,5 L/Ha + ajouter à la solution.
  - ou - SERK..... 1,5 "
  - ou - BAYTHROID..... 0,3 "
  - ou - TALSTAR..... 0,2

(pour couverture du risque pucerons et bruches).

En cas de doute, n'hésitez pas à consulter votre technicien, ou la Ferme de Loudes, ou la Protection des Végétaux de Carcassonne : TEL. 68.71.18.58.

\*\*\*\*\*

## T O U R N E S O L

\*\*\*\*\*

**PHOMOPSIS** : Risque très important de Phomopsis sur les cultures levées :

- ( le suivi du champignon en toutes situations, Carcassonne, Bram, Castelnaudary, Soupex, Pécharic et le Py, indique que les agents de contamination de ce champignon sont très largement dispersés).

Traitez dès réception à l'aide de :

- PELTAR Flo..... 5 L/Ha

en veillant tout particulièrement au réglage du pulvérisateur et en diminuant le volume d'eau au minimum possible.

La pulvérisation sera dirigée autant que possible sur les rangs.

**LIMACES** : Risque très important, utilisez en 1ère application :

- MESUROL..... 3 Kg de micro granulés par Ha.

en traitement d'entretien : HELUGEC..... 8. 10 Kg/Ha.

\*\*\*\*\*

## M A I S

\*\*\*\*\*

**SESAME** : R.A.S.

(Tirage du 11 Mai 1988 - 1600 exemplaires)

(c) Bulletin technique des Avertissements Agricoles - Montpellier 1988 - S. P. V.